

## Corrigé exercice 7

### HYDROLYSE DU CHLORURE DE TERTIOBUTYLE

1) La première remarque à formuler est la suivante : puisqu'il s'agit d'une **hydrolyse**, le réactif eau est également le solvant. Cela signifie que la quantité de molécules d'eau est extrêmement importante en comparaison de la quantité de molécules de chlorure de tertio-butyle. La concentration en eau est donc quasiment constante et il y a **dégénérescence de l'ordre**. L'expérience ne peut donner accès qu'à l'ordre de la réaction par rapport au chlorure de tertio-butyle. Lorsque l'énoncé parle de cinétique d'ordre 1, il s'agit donc de l'ordre **par rapport au chlorure de tertio-butyle**. Autrement dit, la constante de vitesse notée  $k$  dans l'énoncé est en réalité une constante de vitesse apparente.

On réalise alors un tableau d'avancement (en concentrations) :

	$(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$	$(\text{CH}_3)_3\text{COH}$	$\text{H}_3\text{O}^+$	$\text{Cl}^-$
$t = 0$	$C_0$	0	traces	0
$t$	$C_0 - x$	$x$	$x$	$x$
$t \rightarrow +\infty$	0	$C_0$	$C_0$	$C_0$

*Remarque : Les traces d'ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  présentes initialement et négligeables par la suite proviennent de l'autoprotolyse de l'eau.*

Mais attention, **il faut toujours utiliser les notations de l'énoncé**, c'est-à-dire que l'on note  $C$  la concentration de  $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$  à l'instant  $t$ . Par conséquent,  $C = C_0 - x$  ; la concentration commune à  $\text{H}_3\text{O}^+$  et  $\text{Cl}^-$  est donc  $x = C_0 - C$ .

L'énoncé demande de vérifier que la réaction est d'ordre 1, ce qui suggère d'utiliser la méthode intégrale.

On commence donc par **intégrer la loi de vitesse** de l'ordre 1 comme dans le cours. L'expression :

$$v = k \cdot C^1 = \frac{dx}{dt} = -\frac{dC}{dt}$$

...s'intègre en :

$$C = C_0 \exp(-kt)$$

Il faut alors convertir cette expression en conductivité.

En notant  $\lambda_{i,0}$  les conductivités ioniques molaires, comme indiqué dans l'énoncé, on trouve la conductivité à  $t$  :

$$\sigma = (\lambda_{\text{H}_3\text{O}^+,0} + \lambda_{\text{Cl}^-,0})x = (\lambda_{\text{H}_3\text{O}^+,0} + \lambda_{\text{Cl}^-,0}) \cdot (C_0 - C)$$

Or d'après la relation de vitesse intégrée :

$$(C_0 - C) = C_0(1 - \exp(-kt))$$

D'où :

$$\sigma = (\lambda_{\text{H}_3\text{O}^+,0} + \lambda_{\text{Cl}^-,0})C_0(1 - \exp(-kt))$$

Le problème à ce stade est qu'on ne connaît pas les conductivités molaires des ions.

Pour éliminer des constantes inconnues, il faut penser à utiliser les points particuliers du tableau de valeurs, en général l'instant initial ou bien la « très longue durée » ( $t \rightarrow +\infty$ ).

Ici, la conductivité initiale n'a pas de sens car elle est due essentiellement aux impuretés. En revanche, lorsque la réaction est terminée, les ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  et  $\text{Cl}^-$  atteignent leur concentration maximale égale à  $C_0$ .

On peut donc exprimer la conductivité à  $t \rightarrow +\infty$  :

$$\sigma_{\infty} = (\lambda_{\text{H}_3\text{O}^+,0} + \lambda_{\text{Cl}^-,0})C_0$$

En introduisant cette valeur dans la relation précédente, on trouve :

$$\sigma = \sigma_{\infty}(1 - \exp(-kt))$$

Il reste à **linéariser** l'expression :


$$\sigma - \sigma_{\infty} = -\sigma_{\infty}\exp(-kt)$$

$$\frac{\sigma_{\infty} - \sigma}{\sigma_{\infty}} = \exp(-kt)$$

Et finalement :

$$\ln\left(\frac{\sigma_{\infty} - \sigma}{\sigma_{\infty}}\right) = -kt$$

2) La cinétique est d'ordre 1 si, et seulement si, elle vérifie l'expression précédente. Pour le vérifier, on porte donc  $y$  en fonction de  $t$ . Si les points sont alignés avec l'origine, alors on pourra conclure à une cinétique d'ordre 1.



Les points apparaissent bien alignés, ce que confirme un assez bon coefficient de corrélation :  $R^2 = 0,9995$ . Les points sont équitablement répartis de part et d'autre de la droite de régression, sans courbure apparente.

L'ordonnée à l'origine vaut  $-0,0053$ , ce qui est inférieur à la précision donnée sur chaque ordonnée et donc compatible avec un passage par l'origine.

Les points expérimentaux sont bien alignés avec l'origine, ce qui valide l'ordre 1.

$k$  est l'opposé de la pente de la droite, soit :

$$k = 1,1 \cdot 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$